



Środki ochrony roślin

Fusilade Forte 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:

fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – **150 g/l (15,8%)**.



Uprawa	Dawkowanie	Chwasty	Karencja
burak cukrowy	10-20 ml/100 m ² / 1-4 l wody		56 dni
ziemniak	10-17 ml/100 m ² / 1-4 l wody		90 dni
rzepak ozimy	7,5-20 ml/100 m ² / 1-4 l wody		90 dni
burak pastewny	6-20 ml/100 m ² / 1-4 l wody		56 dni
rzepak jary			90 dni
gryka, słonecznik, len włóknisty, len - plantacje nasienne, mak, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch pastewny, soja			90 dni
cykoria korzeniowa,			56 dni
chmiel			30 dni
groch na nasiona			35 dni
grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, żurawina	6-25 ml/100 m ² / 1-4 l wody	chwastnica jednostronna,	28 dni
truskawka			42 dni
malina, jeżyna			45 dni
leszczyna, orzech włoski		miotła zbożowa,	21 dni
porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka wysoka			90 dni
marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka	6-16 ml/100 m ² / 1-4 l wody	owies głuchy, perz właściwy,	49 dni
seler korzeniowy, cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula z dymki, czosnek	6-25 ml/100 m ² /1-4 l wody	samosiewy zbóż,	28 dni
por z siewu, por z rozsady			42 dni
sałata, sałata - plantacje nasienne, cykoria, endywia, szpinak, jarmuż, szczypiorek, pietruszka naciowa	3-12,5 ml/100 m ² / 1-4 l wody	włośnica zielona	42 dni
koper włoski, rabarbar, seler naciowy			49 dni
fasola szparagowa			28 dni
szparag			180/42 dni
fasola na nasiona	6-25 ml/100 m ² / 1-4 l wody		90 dni
fasola na zielone nasiona - w gruncie, fasola na zielone nasiona - pod osłonami, bób			35 dni
groch zielony			28 dni
karczoch zwyczajny	4-16 ml/100 m ² / 1-4 l wody		42 dni
rośliny zielarskie	3-16 ml/100 m ² / 1-4 l wody		42 dni
rośliny ozdobne w gruncie, rośliny ozdobne pod osłonami, wierzbą, leśnictwo - szkółki	6-25 ml/100 m ² / 1-4 l wody		nie dotyczy

50 ml KKA-00034 opak. zb.: 12 szt.



100 ml KKA-00539 opak. zb.: 12 szt.



Okres prewencji: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.